

Przygotowanie do USG jamy Brzuszej

Trzy i dwa dni przed badaniem

- po każdym posiłku zażyć 2 kapsułki środka ułatwiającego wydalanie gazów jelitowych np. Espumisan Easy

Dzień poprzedzający badanie

- Należy unikać spożywania produktów powodujących powstanie nadmiernej ilości gazów, takich jak: napoje gazowane, świeże warzywa i owoce, otręby, kasza, bita śmietana czy świeże pieczywo
- po każdym posiłku zażyć środek ułatwiający wydalanie gazów jelitowych osoby otyłe lub ze skłonnościami do zaparcia powinny zastosować środki przeczyszczające (Bisakodyl 2 tabletki) – jednak nie później niż 24 godziny przed badaniem
- nie należy stosować lewatywy
- ostatni posiłek zjeść nie później niż o godzinie 17.00

Dzień badania

- na badanie należy zgłosić się na czczo, nie należy nic jeść ani pić, palić papierosów i zażyć tylko niezbędne leki
- rano zażyć 2 saszetki Espumisanu Easy środka ułatwiającego wydalanie gazów jelitowych
- zadbać o wypróżnienie
- pacjenci zarejestrowani po godzinie 14.00 mogą najpóźniej o godzinie 8.00 rano zjeść bułkę z masłem i wypić gorzką herbatę
- na 2-3 godziny przed badaniem wypić około 1 litra niegazowanego płynu
- **NA BADANIE NALEŻY PRZYJŚĆ Z UCZUCIEM PARCIA NA PĘCZERZ MOCZOWY**